


✓
287
Presentation copy from
the author



Al Signor Cesare Piovano,
uno degli amici più cari del com-
pianto mio Luigi che divide la
trepidanza e le gioie che venivano
procurate dalla coltura appassionata
della storia de' libri antichi.

Per tali servi mi professo anch'io
di Lei

Alf. Amico

Maggio 9. 1892. Costanza Pozzi W. Angiolini

BARTHOLOMEO NIGRISO
FERRARIEN PATRITIO IO
IOHANNES BAPTISTA CA
NANVS FERRARI
ENVS MEDICVS
MUSCVLORVM HVMANI COR
PORIS PICTVRATA DISSECTIO
PER IOANNEM BAPTISTAM
CANANVM FERRARIEN
SEM MEDICVM, IN BAR
THOLOMEI NIGRISO
LI FERRARIENSIS
PATRITII
GRATIAM, NVNC PRIMVM
IN LVCEM EDITA.



Jacobi bonifacii ap^{ta} Canani munere.

MUSCULORVM HVMANI COR-
PORIS PICTURATA DISSECTIO
PER IOANNEM BAPTISTAM
CANANVM FERRARIEN-
SEM MEDICVM IN BAR-
THOLOMEI NIGRISO-
LI FERRARIENSIS
PATRII
GRATIAM, NVNC PRIMUM
IN LUCEM EDITA.



*Exemplum in Museo
Nat. Hist. Ferrar. 1717*

BARTHOLOMEO NIGRISOLO

FERRARIEN. PATRITIO IO

ANNES BAPTISTA CA

NANVS FERRARI

ENSIS. MEDI

CVS. S. D.

Galenus Pergamenus Medicorum omnium post Hippo-
cratem facile princeps, inter alia singulari, ac rar-
a eruditione repleta commentaria, quae in amicorum
gratiam et medentium usum composuit, a veterum quoque
et recentiorum id est dissectorias administrationes, primum quis-
dem duobus voluminibus comprehensas, Vt Flauio Boe-
thio Romanorum consuli viro anatomicae speculationis maxis
meritum et more gereret, conscripsit, Secundo autem post Boe-
thii obitum, alias (quae aliqua ex parte extant) longe illis
superiores, amicorum precibus compulsus, exaravit. In quibus
modum, ac ordinem disseccandarum Simiae partium,
utpote animalis homini quam simillimi, plenissime docuit.
Cum itaque et tu Bartholomee Nigrisole, Nobilissime pa-
triter, et doctissime, non minus anatomicae speculationis de-
siderio nunc ardeas, quam Flavius ille Boethus vir consue-
laris olim arserit, Et nobis humana corpora disseccantibus saepe
affueris, quantaeque necessitatis ac utilitatis in re medica
(praesertim quae manu medetur) sit anatomes peritia, non solum
ex Galeni testimonio, verum et oculis ipsis perspexeris,

videasq; nostrae tempestatis charurgos, maiori ex parte, dissectionum imperitos, ad propterea exitio hominibus plerumq; potius, quam salutem esse conspicias, sepiissime nos hortari non destitisti, ut humani corporis partes, nostra opera, picturis expressas in lucem ederemus. Sic enim fieri posse arbitrabaris, ut qui rem medicam profitentur et ex dissectionum oculis lata inspectione corporum partes agnoscere non possunt, si ex pictura saltem aliquam illarum cognitionem haberent, tutius humanae salutem consulere valerent. Cui tam crebrae tamq; saluberimae exhortationi tuae diutius repugnare, ac obsistere non potuimus, tanta enim est humanitas tua, tantaq; tuorum erga me meritorum magnitudo, ut me quippiam tibi negare piaculum putem. Variis igitur cum sint hominum partes, nullae tamen sunt, quae magis rerum extrinsecarum appulsu ledantur iis, quae muscoli dicuntur, Musculi enim vulnerantia, pungentia, tudentia vè, primi excipiunt, eam ob rem hos ipsos eleganti pictura, per Hieronymum Carpentem, pictorem nostro aëro non minus diligentem, quam insignem, delineatos, in tuam gratiam, et hominum salutem, edere decreuimus. Prodeunt itaq; tuis auspitiis, et in lucem exeunt, vir ornatiissime, humanorum artuum musculi, quos, quanta valuius diligentia, Antonio Mario Canano Ferrariensi Medico, mihi artissima consanguinitate coniuncto monstrante, dissectuimus, et Typis excudi curauimus, eosq; nunc tui nominis immortalitati dicamus, opus autem hoc nostrum lectorum oratos velim, ne ipsum prius damnet, quam cum re ipsa

sa, sæpè inspiciendo, id contulerint. Sic enim arbitror ipsos, conatus nostros boni pòtius consulturos, quàm in eos gea
minum inique fracturos.

Vale.

CANDIDO LECTORI.

QUum corpora et viua, et mortua secari possint, utrunq; secandi modū ex antiquioribus aliqui (celaso referente) vituperarunt, Primum, veluti crudelem et medico, humanę salutis præfidi, non conuenientem, viutorum quippe hominum aluum, atq; precordia incidere, lacerocinantis potius medici esse putabant, quàm quā'ia sint hominis interiora discere cupientis, cum præsertim ex his, quę tanta violentia querantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere, Nam color, mollities, durities, leuitas, asperitas, talia non sunt inciso corpore, qualia integro fuere, quoniam si corpora inuiolata, metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, milleq; aliis affectibus quibus obnoxia sunt mutantur, multo magis interiora, quibus maior mollities, et lux ipsa noua existit, sub grauissimis vulneribus et ipsa trucidatione mutantur, stultumq; videtur, quale quidque viuo homini est, tale morienti, imo iam mortuo, esse existimare, si quid tamen sit, quod spirante adhuc homine, aspectui subiiciatur, id casus sæpe curantibus offert, contingit enim interdum hominem sic vulnerari, vt interior aliqua pars nudetur, et in alio alia, vnde sedem, ordinem, figurā, magnitudinem, similiaq; alia prudens medicus per misericordiam sanitatem moliendo, quæ alii per cædem dira crudelitatem, cognoscit. Ob hoc ne alterum quidem sectionis modū, mortuorum scilicet lacerationem, necessarium esse dicebant,

qui et si non crudelis, foedus tamen existit, cum aliter plæ-
raque in mortuis se habeant. et quæ in viuis cognosci posse
sunt, ipsa curatio aliunde demonstret. Cæterum hæc ipsa,
corporum anatomen non verè oppugnantia illius vtilitatem
ac necessitatē agnoscentes facile confutabunt, duplex enim
cum sit corporum dissectio, viuorum scilicet, et mortuorum
ex prima (si recte administretur) internarum aliquot partiū
(et si non omnium) actionem ad earum curationes cognitu
necessariam, agnoscemus, non quidem viuos homines secū-
do (quod crudelis, et carnicis potius hominis, quàm medis,
esse videtur) sed bruta magis animantia, quæ quàm plus-
timis ex partibus, atq; earum functionibus homini quàm si-
millima sunt, vt in renibus, vteris, vesica, vtero, intestis,
testibus, omēto, liene, ventriculo, hepate, transuerso septo,
gulla, pulmōibus, corde, et similibus aliis, ex altera verò
mortuorum dissectione, partium figuram, numerum, situm,
colligationem, et actionem quandoq; (vt musculis ad origi-
nē tractis) res ad medēdi peritiā maximè necessarias disces-
re licet, Nec hoc foedum est, imo pulchrum, valdeq; conue-
niens, si laborantium partium curationem, et agnitionē, ad
quam casus sufficere nullatenus potest, nobis ipsis præ o-
culis posuerimus, rara enim vulnera sunt, per quæ interiora ita
aperiantur vt eorum figuram, positum, societatemq;, adamus-
sim cognoscere valeas, et si casu aliquibus partibus id eue-
niat, non omnibus tamē inq; euenerit, Verum in mortuo-
rum dissectione omnes hominis partes breui tempore cognosca-

cimus, quas per casum homini, quantum vis laborioso, et
prudenti, etiam si nestoreos annos viueret, cognoscere non da-
retur. Cum igitur, et in viuorum animantium, defunctorumque
hominum dissectione, quantum nobis per adolescentiam nos-
tram licuit, diligenter admodum versati fuerimus, multaque
ab antiquis iam pridem litterarum monumentis tradita ocu-
lis ipsis perspexerimus, nonnulla etiam nostra opera adinue-
nerimus, a communi medentium usu non aliena, dignum dua-
ximus horum aliqua medicinae sectatoribus impartiri. Hincque
effectum est, ut Primum hunc musculorum dissectionis libe-
rum crebris Bartholomei Nigrisoli Ferrarien. Patritii effla-
gitationibus impulsus ediderimus, Reliquos sub calchographi
prelo iam positos mox edituri. Hunc itaque benigno animo
accipias velim candide lector, tua enim benignitas perinde
ac calcar quoddam erit, quod me ad maiora assidue impela-
lat, Tu interim vale, deosque nobis, tantis in laboribus pro-
pitios precare, Instituti vero nostri ita nascatur exordium.

IONNIS BAPTISTAE CANA-
NI FERRARIENSIS ME-
DICI HVMANORVM
MVSCVLORVM
PICTVRATAE
DISSECTI-
ONIS.


LIBER PRIMVS.

IN hoc primo libro Galenum sequentes Manus mus-
culos ponemus, nomine autem manus (Hippocratis et
Galenimore) vulgo dictum brachium intelligimus, quod
in tres primarias partes diuiditur, extremam scilicet manum
(quae absoluto nomine, manus dici solet) cubitum, et βραχι-
ονα a Graecis appellatum, extrema manus tres habet par-
tes, digitos videlicet, brachiale quod Graece ραγω's nomi-
natur, et inter hec medium, Graeci μεταραγω's nuncupant,
nos postbrachiale dicimus. Brachium suae malis Graece δι-
σπρωκον vnico osse constat, quod Celsus humerum ap-
pellauit, Cubitus vero (quem brachium nominat) duobus,
quorum vnus Graece ραγ's latine radius dicitur, alter autem
a Graecis quidem τωκ'us a Celso vero cubitus nominatur,
At in extrema manu septem et viginti ossa existunt, octo
scilicet brachialis, quatuor postbrachialis, et quindecim dis-

MVSCVLORVM . ANATOMES

*gitorum, quę omnia nouisse oportet ad exactam musculorū
in hoc primo libro depictorum cognitionem, hec pauca præ
fati ad propositum accedamus.*

LIBER PRIMVS.



Hac in pictura hi nu-
dantur muscoli video
licet.

A. MVSCV
LVS Flectens bra-
chiale ad minimum
digitum.

B. MVSCV
LVS Volæ.

C. MVSCV
LVS Tendonum
scissorum, sub quo est
musculus habens ten-
dines non fissos am-
bo digitos flectunt.

D. MVSCV
LVS Flectens bra-
chiale propè magnū
digitum.

E. MVSCV
LVS Manum pro-
nam faciens.

F. MVSCV
LVS. Manum su-
pinam redens.

MVSCVLORVM ANATOMES.




MVSCVLVS

Volæ manus qui secundum antiquos (vt ait Galenus secundo de usu partiũ et primo de Anatomicis aggressionibus; flectit et ipse quinque digitos secundum ipsum autem factus est, ad firmandam cutim manus internam, melioris apprehensionis gratia, ad prohibendũ ortum pilorum, causa exquisitiore sensus. Ratio vèrò Galeni primo de Anatomicis aggressionibus contra antiquos est. Oportet inquit secundum antiquos tendinem musculi mouentis aliquẽ articulum inseri ossi illius. Ast tendo mus


culi velle non inferitur ossibus digitorum, igitur non potest secundum eorum placita digitos mouere. Ratio autem hec licet contra antiquos sit valida, simpliciter tamē videtur in-
 valida, Posset enim quispiam dicere, non esse necessarium semper tendinem musculi mouentis articulum inferi, sive cō-
 iūgi ossi articuli, sed sat fore si iungatur alicui cōiuncto ossi,
 prout tendo huius musculi coniungitur ligamento, quod iū-
 ctum est ossibus digitorum. Oritur hic musculus ab interno
 brachii nodo, mediusq; procedens inter musculos carpi flec-
 tētes, suo tendine supereminet ligamento interno, quod iun-
 git cubitum radio, postea dilatatur illius tendo in trianguli
 figura, cuius acumen est prope ligamentum dictum, basis
 autem in principio postbrachialis, quæ per quatuor veluti ten-
 dines inseritur ligamento, comprehendenti aliorū digitos flec-
 tentium musculorum tendines, Et si variam hunc tendinem li-
 cet secare cō cute videlicet, et sine cute.

MVSCVLORVM ANATOMES



MVSCVLVS

Flectēs brachiale, qui
 oritur ab interiore no
 dō brachii, cubito ad
 herens, inserit ossi rec
 to, mēbraneoq; quod
 ē regione minimi dig
 giti, et secūdum cuz
 biti processū existit,
 quē Græci anatomici
 modo γκαφμοειδής
 modo στυλοειδής nomi
 nabant.



MVSVLVS


Flectēs brachiale pro
pè magnum digitum,
Oritur ab interiore
nodo brachii obliqua
usq; aliquāntisper su
pra cubitum tendens,
radio protensus, inse
ritur per tendinem os
si postbrachialis ante
indicem, licet primo
aspectu videatur in
seri ossi brachialis pro
pè magnum digitum.

MVSCVLORVM ANATOMES



MVSCVLVS
*Desinens in tendines
fissos flectens secun-
dum articulum digi-
torum, præter articu-
lum magni digiti qui
non accipit tendinem
ab hoc musculo, oris-
tur ab interiore nodo
brachii aliquàliter cu-
bitum attingendo, in-
seriturq; tendinibus se-
cundo interno dio qua-
tuor digitorum, conti-
neturq; sub ligamèno
to radium, et cubitū
interna in parte con-
stringente.*

LIBER PRIMVS



MVSCVLVS

flectens, secundū Ga
lenum, primū ex tert
tium articulum quatu
or digitorū, magni au
tē digiti tantū secun
dum ex tertium inter
nodiū flectit, Oritur
à partibus cubiti ius
ta gibberum, ex per
profundiora mediam
radii cubitiq; regionē
vniuersam cōplexus
vtriq; ossi coheret, ac
in tres veluti partes
delineatus est, quarū
vna minimum digitū
respicit, altera indicē,
tertia medios digitos,
Cōtinētur huius mus
culi tendines sub liga
mento stringente radi
um, ex cubitū intrin
secus, per mediasq;
scissiones tēdinū flects


MVSCVLORVM ANATOMES

sentium secundum internodium quatuor digitorum ad eorum
extremitatem feruntur, et vna cum tendinibus præcedentis,
sub eodem ligamento á principio digitorum, vsq; ad finem
protensi sunt, per quod ligamentum vult Galenus hunc mus-
culum flectere primum internodium digitorum quatuor, ves-
rum non maior videtur ratio de illo, quam de hoc ipso, cum
ipsius tendines sub eodem ligamento comprehensi sint.



MVSCVLI, pro
nam facientes manū,
quorum alter oritur
ex elatioribus parti-
bus nodi interioris bra-
chii, obliquusq; supra
cūbitum latus inseris-
tur radio intrinsecus
ad medias ipsius vsq;
partes extensus. Reli-
quus vero ex inferiori
parte cubiti iuxta
brachiale exortus oba-
liquus inseritur ossi ra-
dii, habent terminum
carnosum et tamen
ossa mouent, licet Ga-
lenus Primo de motu
musculorum scribat,
Musculos mouentes
ossa in tendines omo-
nino maiores vel mi-
nores terminare. De
propositis aut in secu-
do de vsu partiū opo-
positum asserit.

MVSCVLORVM : ANATOMES



In hac pictura hi appa-
rēt musculi vide
licet.

A. Musculus ex inte-
rioribus vnus, qnq; tē-
dines nō fillos pducēs

B. Musculus supinā
manum reddens.

C. Musculus brachi-
ale ad minimum digi-
tum reflectens.

D. Musculus minia-
mū digitū extendens,
ac in latus ducens.


E. Musculus digitos
tres extendens.

F. Musculus indicē
in latus ducens.

G. Musculus bifidus
magmū digitū ab aliis
abducendo exiēdens.


H. Musculus duplici
tendine carpi evertens

I. Musculus supinam
manum faciens.




Musculus q̄ secundum
Galenum quatuor ha
bet tēdines ad quatu
or digitos præter mas
gnū tēdētēs, re autem
ipsa tantū tres habere
videtur ad tres digis
tos iter magnū et mi
nimū porrectos, ex quī
bus duo duplices apz
parēt, tēdo scilicet in
dicis, et tēdo ānularis
q̄ duas habet propagi
nes, quarū vna cōiun
gitur tēdini ad medio
um digitū tēdētī, alte
ra vero ei q̄ ad mini
mū digitū procedit, et
ā pprio musculo origi
nē ducit Cōtinet hic
musculus sub ligamē
to extrinsecus strins
gēte radius et cubi
tum, ortūq; habet ab
exteriore nodo brachii
et supra radiū ptēdit

MVSCVLORVM ANATOMES.




MVSCVLVS,
oriens á nodo exte-
re brachii cubito, ra-
dioq; per longitudinē
hærens, et sub pro-
prio ligamento in fine
cubiti astrictus, suo
tendine ossi postbra-
chialis ante minimū
digitum insertus, bra-
chiale ad minimum
digitum extendit.



MVSCVLVS


ex nodo exteriori bra-
chii oriens, radium et
cubitum per longitu-
dinem attingens, in fi-
ne cubiti proprio liga-
mento cōtentus in du-
os tendines scinditur
ad minimum digitum
tendentes, ipsumq; in
latus, vel in inferior-
em partem ab aliis
digitis extendēdo ab-
ducit.

MVSCVLORVM ANATOMES



MVSCVLVS
oriens ex cubito eiꝑꝰ
adherens sub cōmuni
ligamento stringente
radius et cubitū cō-
tentus, vnicum tendē-
nem ad indicem pro-
ducens, non duos ad
indicem et medium,
vī vult Galenus, du-
cit indicem in latus.

LIBER PRIMVS



MVSCVLVS,
Oriens ex cubito su-
pra eius medium, radi-
um attingit, sub pro-
prio; ligamento in fi-
ne radii astrictus, uni-
cum tendinem produ-
cit, per totum magnū
digitum protensum, et
in latus ipsum ducit
secundum Galenum.

MVSCVLORVM ANATOMES



MVSCVLVS
ex membrana diuidēte interiores musculos ab exterioribus, cubitoq; exortus, radium ascendit, sub proprio q; ligamēto, in fine radii (vbi insculptus est radius) continetur, duos tendines producit, quorū vnus inseritur extremitati primi ossis magni digiti nō pcedens ad vltimam eius aciem, vt voluit Galenus, alter vero inseritur ossi brachialis antè magnum digitū. Poteſt hic musculus pro duobus haberi, ait Galenus, per alterū enim tendinem brachiale ad magnum digitū extēdit, p reliquū verò abducit ma

gnum digitum ab aliis ipsum aliquamiter extendendo.

LIBER PRIMVS.




MVSCVLVS,
*exoricens à nodo exte-
 rior brachii suprarad-
 dium protensus, pro-
 prio ligamēto in fine
 radii astrictus, bifido
 tendine ossibus post-
 brachialis antè indig-
 cem, et medium dig-
 gitos insertus totum
 brachiale euertit.*

MVSCVLORVM ANATOMES



MVSCVLVS
oriens ex ligamento
mēbraneo articuli cu
bitum aliquatenus at
tingēs, radio qua emi
net per extremum ner
uosus insertatur, supi
nam facit manum.


LIBER PRIMVS.



MVSCVLVS

Supinam manum red
dens ex brachio proz
pè medium exorians,
suprarium protens
sus illi suo fine ad
vsq, brachiale inserit


MVSCVLORVM ANATOMES.



A. Musculi quatuor exiles, orientes ex mēbranis circundantibus tendines non fissos, digitorū latera subeunt, in dextra quidē (ma-
nu existente prona) versus sinistram in si-
nistra aut versus dex-
tram, habent mouere
digitos in latus, q̄ qui-
dē sunt in dextra ver-
sus sinistram, et qui
in sinistra versus dex-
tram.

B. Musculus, oriens
ex osse cui annectitur
tendo musculi brachi-
ale ad minimum dis-
gitum flectentis, inse-
ritur minimo digito in
feriore in parte, et
ipsum ab aliis digis-
tis abducit.

LIBER PRIMVS.




C. Musculus, oriens à primo osse brachialis ppè magnū digitū cui inseritur, habet secundū Galenū abducere eū ab aliis. At videtur factus ad trahēdum potius magnū digitū versus minimū.

D. Musculus suo capite ossi postbrachialis antè mediū digitū affixus, obliqꝫ fibris inserit primo ossi magni digiti, habet adducere magnū digitū ad indicē interius inclinādo.

E. musculus, siue musculi q̄ siti sunt, supra musculū abducētē minimū digitū ab aliis, in parte interiore manus extreme, obliquis fibris cuti herent, et suis tēdinibus tendini


volē iunguntur, horum musculorū nō meminit Galenus; qui ad tēdinis volē dilātationem facti videntur.

MVSCVLORVM ANATOMES




MVSCVLVS
de quo Galenus non
meminit, qui in parte
exteriore manus post
brachiali antè indicē
affixus, obliquis fibris
ossi primo magni di-
giti insertus, eum ad
indicem adducit, exte-
rius inclinando, simul
autem cum secundo
præcedentium rectam
adductionem facit,

LIBER PRIMVS



Octo muscoli exiles
corpus vnū carnosum
efficientes, ex coarticu-
latione brachialis, cū
postbrachiali exorti,
binatim priori de artio-
culationi digitorum,
ex interioribus parti-
bus inserti, lateraliū
partium aliquid acci-
pientes, simul rectam
flexionem primi artis-
culi faciunt, seorsum
verò flectunt, in latus
parū quid inclinādo.

MVSCVLORVM ANATOMES



Hac in pictura hi nu-
dantur musculi vidè
licet.


**A. Musculi vlnam
extendentes.**

B. Musculi vlnā flexi-
tentes.

C. Caput musculi su
pinā manū reddētis.

D. Musculus cervicis quem aliqui ΔΕΛΤΑΙΔΗΝ appellavūt quoniam Δ grece litteræ figuram imitatur.

LIBER PRIMVS



MUSCULVS


iuxta venā humeralē
citra confectionē com-
spicius, duo habet ca-
pita, vnum per patu-
lā brachii rimam ad
scapularum cervicis
eminentiā procedens,
alterum ad processum
α' ρ' χ' υ' γ' ο' ε' δ' η' vel ρ' ο' γ' α'
η' ε' δ' η' dictū, hec capi-
ta in idem venientia
hunc musculū genera-
rūt, qui nervosā exili-
tatē faciēs, validū tē-
dinē procreat, quo ra-
dio inseritur, et mem-
branosū ligaminis ar-
ticuli aliqd accipiēs
totū articulū attollit,
paulatim ad interiora
inclinando, cum mus-
culo autem ei subiec-
to rectam flexionem
operatur.

MVSCVLORVM ANATOMES



MVSCVLVS
ex duobus carnosis
principiis brachio cir-
cundatus, vno in pos-
teriori parte altiore,
altero in anteriori hu-
miliore, quæ capita in
idem coeuntia muscu-
lum hunc generant, q
in nerueam desinens
tenuitatē, in cubiti os
insertam, flectit artis-
culum in exteriora pa-
ulatim inclinando, cū
supposito autem mus-
culo rectam flexionē
facit,






MVSCVLVS

ab humili latere scapularū ex dimidio ferè superioris eius partis ortus, iungitur alteri musculo, capiti brachii subdito, ambo per tendinem latum cubiti gibbero inseruntur, qui tendo duplex apparet sequendo fibras, exteriorēq; partē ab hoc musculo accipit, interiorē autem ab altero, et si disiectū vnum ab reliquo attrahas, totā vt Galenus inquit, manū extendes, hoc discrimine intercedente, quod hic in exteriora, alter in interiora aliquantulum deflectendo extendit.

MVSCVLORVM ANATOMES.



MVSCVLVS

oriens sub capite bra-
chii, qui iungitur mus-
culo præcedēti, et alte-
ri musculo ei subdito,
adeo vt ipsius particu-
la ab anatomicis pua-
retur, possunt tamen
pro fibrarum rectituz
dine seperari, habet
(vt ait Galenus) extē-
dere manum totam in-
tro oblique deflectēdo

LIBER PRIMVS.



MVSCVLVS

qui pars præcedentis
ab Anatomicis puta-
tur, perpetuò carnos-
sus, posterioribus par-
tibus gibberi inserit,
rectam articuli exten-
sionem facit.

LIBRI PRIMI
FINIS.

ad hoc et per hoc
non est in se
sed est in se
et per hoc
et per hoc
et per hoc

FINIS
LIBRI PRIMI



217.

com/cl/e

YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL
LIBRARY

Accession no.
EC

Author
Canano, G.B.
Musculorum humani
corporis — Ferrara,
Call no. 1541?

16th Cent

